

การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่สัมพันธ์กับตับอักเสบและตับแข็ง: รายงานผู้ป่วย

Periodontal Treatment in a Patient with Thrombocytopenia Related to Hepatitis B and Cirrhosis:

A Case Report

ศรินทิพย์ ปิติวัฒน์สกุล

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

Sarintip Pitiwatsakul

Chiangrai Prachanukroh hospital, Chiangrai

บทคัดย่อ

การมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำเป็นระยะเวลานานพบได้ในผู้ป่วยที่มีตับแข็งและตับอักเสบ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออก จากเหงือกหลังการรักษาโรคปริทันต์ ดังนั้นทันตแพทย์ควรมีความเข้าใจระบบการแข็งตัวของเลือดเพื่อการส่งตรวจผลเลือด ทางห้องปฏิบัติการคลินิก และวางแผนการรักษา ร่วมกับแพทย์อย่างเหมาะสม ผู้ป่วยรายนี้มีเกล็ดเลือดต่ำอย่างรุนแรง ได้รับ เกล็ดเลือดเข้มข้นและพลาสมาสดแช่แข็งก่อนทำการรักษาโรคปริทันต์ ไม่มีภาวะเลือดออกหลังการรักษา และมีการหายของ แผลเป็นปกติ

**คำสำคัญ:** การรักษาโรคปริทันต์ เกล็ดเลือดต่ำ ตับอักเสบ ตับแข็ง

Abstract

Thrombocytopenia in the patient related cirrhosis and hepatitis B caused the risk of gingival bleeding. In periodontal treatment plan, dentist should concern about the coagulation pathway. Haematological laboratory examinations were important prior to periodontal treatment. Dental and medical team work should cooperate to avoid bleeding complication after treatment. Platelet and fresh frozen plasma transfusions were necessary in such a case before periodontal treatment. As a result, the patient had normal wound healing and no bleeding complication.

**Keywords:** periodontal treatment, thrombocytopenia, hepatitis B, liver cirrhosis